

Causas da pericardite aguda

Causa	Exemplos
Doenças autoimunes	Artrite reumatoide Lúpus eritematoso sistêmico Esclerodermia
Infecções bacterianas	Bacilos Gram-negativos <i>Haemophilus influenzae</i> (em crianças) Doença de Lyme Febre reumática Estafilococos Streptococos Tuberculose*
Câncer	Câncer de mama Sarcoma de Kaposi (em pessoas com aids) Leucemia Câncer de pulmão
Fármacos	Anticoagulantes Hidralazina Isoniazida Metisergide Penicilina Fenitoína Procainamida
Infecções fúngicas	Blastomicose Candidíase Coccidioidomicose Histoplasmose
Idiopática	—
Doenças inflamatórias	Amiloidose Doença inflamatória intestinal

* A pericardite tuberculosa é responsável por < 5% dos casos de pericardite aguda ou subaguda nos EUA, mas pela maioria dos casos em algumas áreas da Índia e da África.

†Se os portadores de aids desenvolverem linfoma, sarcoma de Kaposi ou certas infecções (p. ex., infecções por *Mycobacterium avium*, *M. tuberculosis*, *Nocardia* e outras infecções fúngicas ou virais), eles podem desenvolver pericardite.

Causa	Exemplos
	Sarcoidose
Infarto do miocárdio	—
Infecções parasitárias	Amebíase Equinococose Toxoplasmose
Síndrome (Dressler) pós-infarto do miocárdio	—
Síndrome pós-pericardiotomia	—
Radioterapia	—
Trauma	—
Uremia	—
Infecções virais	Vírus coxsackie B Ecovírus HIV† Vírus da influenza SARS-CoV-2

* A pericardite tuberculosa é responsável por < 5% dos casos de pericardite aguda ou subaguda nos EUA, mas pela maioria dos casos em algumas áreas da Índia e da África.

†Se os portadores de aids desenvolverem linfoma, sarcoma de Kaposi ou certas infecções (p. ex., infecções por *Mycobacterium avium*, *M. tuberculosis*, *Nocardia* e outras infecções fúngicas ou virais), eles podem desenvolver pericardite.



© 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EUA e suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

MANUAL MSD
Versão para Profissionais de Saúde