

ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Clínica Médica

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. Apresentação: (1) identifica-se e cumprimenta o paciente simulado; (2) pergunta algum dado de identificação (idade, estado civil, profissão e/ou naturalidade).</p> <p>Adequado: realiza todos os procedimentos. Parcialmente adequado: realiza um dos procedimentos. Inadequado: não realiza procedimento algum.</p>	0	0,125	0,25
ANAMNESE			
<p>2. Pergunta sobre manifestações durante e após a crise: (1) movimentos involuntários (ou convulsão); (2) liberação esfíncteriana; (3) lesões na língua; (4) lesões no crânio e na face (ou bateu com a cabeça); (5) padrão de recuperação.</p> <p>Adequado: investiga três ou mais achados clínicos. Parcialmente adequado: investiga dois achados clínicos. Inadequado: investiga apenas um achado clínico ou não investiga achado clínico algum.</p>	0	0,5	1,0
<p>3. Pergunta sobre manifestações que precedem a crise: 1) uso de medicamentos, drogas lícitas e ilícitas; 2) alimentação e jejum; 3) atividade física; 4) eventos similares anteriores; 5) doenças prévias e traumas. Adequado: investiga três ou mais achados. Parcialmente adequado: investiga dois achados. Inadequado: investiga apenas um achado ou não investiga achado algum.</p>	0	0,75	1,5
EXAME FÍSICO			
<p>4. Solicita exame físico (1) geral e (2) neurológico. Adequado: solicita exame físico especificando aspecto neurológico. Parcialmente adequado: solicita exame físico mas não especifica aspecto neurológico. Inadequado: não solicita exame físico.</p> <p>Atenção: O(A) participante só irá pontuar caso solicite o exame físico ANTES de receber o impresso.</p>	0	0,5	1,0

<p>5. Solicita exames laboratoriais: (1) glicemia; (2) sódio; (3) potássio; (4) hematócrito/hemoglobina ou hemograma; (5) cálcio e (6) magnésio.</p> <p>Adequado: solicita de quatro a seis dos exames listados.</p> <p>Parcialmente adequado: solicita de dois a três dos exames listados.</p> <p>Inadequado: solicita um dos exames listados ou não solicita exame algum.</p> <p>Atenção: O candidato só irá pontuar caso ele cite os exames listados ANTES de receber o impresso. Só serão considerados os seis primeiros exames citados pelo participante ANTES de receber o impresso.</p>	0	0,75	1,5
<p>6. Solicita e interpreta o eletrocardiograma (ECG).</p> <p>Adequado: solicita e relaciona os achados do ECG (PR-Curto ou Wolf-Parkinson-White ou presença de onda delta) a riscos de arritmia (ou alteração da atividade elétrica do coração).</p> <p>Parcialmente adequado: solicita, mas não interpreta corretamente o achado.</p> <p>Inadequado: não solicita.</p>	0	0,75	1,5
<p>7. Formula hipóteses diagnósticas.</p> <p>Adequado: identifica e explica o diagnóstico de síncope ou desmaio/perda de consciência de origem cardíaca, relacionando-o à arritmia ou alteração da atividade elétrica do coração (mencionando ou não taquicardia ou pré-excitação ventricular ou Wolff- Parkinson-White).</p> <p>Inadequado: não identifica a síncope ou desmaio/perda de consciência de origem cardíaca.</p>	0		1,5
<p>8. Seguimento do paciente: encaminha para a cardiologia e/ou realização de <i>Holter</i>.</p> <p>Adequado: encaminha.</p> <p>Inadequado: não encaminha.</p>	0		1,5
<p>9. Realiza adequadamente a sequência das tarefas, conforme solicitado nas orientações ao participante.</p> <p>Adequado: realiza.</p> <p>Inadequado: não realiza.</p>	0		0,25

ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
ANAMNESE E EXAME FÍSICO			
<p>1. Apresentação: (1) identifica-se e (2) cumprimenta o paciente simulado. Adequado: realiza as duas ações. Inadequado: realiza uma ou não realiza ação alguma.</p>	0		0,3
<p>2. Pergunta sobre características da dor: (1) tempo de início, (2) localização, (3) progressão, (4) fatores de melhora ou piora. Adequado: pergunta sobre os quatro itens. Parcialmente adequado: pergunta sobre dois ou três itens. Inadequado: pergunta sobre um ou nenhum item.</p>	0	0,3	0,6
<p>3. Pergunta sobre sintomas urinários: (1) frequência, (2) urgência e/ou incontinência urinária, (3) hematúria, (4) noctúria, (5) jato fraco, (6) jato interrompido, (7) sensação de urina residual, (8) odor da urina, (9) Esforço/hesitação miccional inicial, (10) disúria, (11) Gotejamento terminal Adequado: pergunta pelo menos sobre seis itens. Parcialmente adequado: pergunta sobre quatro ou cinco itens. Inadequado: pergunta sobre três itens ou menos.</p>	0	1,0	2,0
<p>4. Pergunta sobre: (1) histórico pessoal e (2) histórico familiar de doenças. Adequado: pergunta sobre os dois itens. Parcialmente adequado: pergunta sobre um dos itens. Inadequado: não pergunta.</p>	0	0,2	0,4

<p>5. Solicita: (1) exame físico; (2) toque retal. Adequado: solicita os dois itens. Parcialmente adequado: solicita um item. Inadequado: não solicita.</p>	0	0,25	0,5
INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA			
<p>6. Solicita exames laboratoriais: (1) hemograma, (2) PCR, (3) PSA, (4) exame de urina (ou urina 1 ou sumário de urina ou parcial de urina), (5) urocultura. Adequado: solicita os quatro itens. Parcialmente adequado: solicita, pelo menos, PSA e exame de urina. Inadequado: não solicita exame de urina e/ou PSA. Atenção: O(A) participante só irá pontuar caso cite os quatro exames corretamente antes de receber o impresso.</p>	0	0,3	0,6
<p>7. Interpreta os exames laboratoriais: (1) HMG com leucocitose, (2) PCR aumentado, (3) hematopúria, (4) PSA aumentado. Adequado: interpreta os quatro itens. Parcialmente adequado: interpreta alteração nos itens (3) e (4). Inadequado: não interpreta os itens (3) e/ou (4).</p>	0	0,4	0,8
<p>8. Solicita exame de imagem: ultrassom OU ultrassonografia OU ecografia de aparelho urinário E/OU de próstata. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p>	0		0,5
<p>9. Formula a hipótese diagnóstica atual de prostatite aguda e/ou hiperplasia prostática benigna Adequado: formula a hipótese de prostatite aguda e/ou hiperplasia prostática benigna Parcialmente adequado: formula somente a hipótese de hiperplasia prostática benigna Inadequado: não formula.</p>	0	0,25	0,5
<p>10. Correlaciona o aumento da próstata no USG com a prostatite e HPB. Adequado: correlaciona os dois diagnósticos. Parcialmente adequado: correlaciona apenas um diagnóstico. Inadequado: não correlaciona nenhum dos diagnósticos.</p>	0	0,4	0,8
CONDUTA TERAPÊUTICA			
<p>11. Indica tratamento: antibiótico ciprofloxacino ou levofloxacino Adequado: orienta o tratamento Inadequado: não orienta o tratamento</p>	0		0,7

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS DO PACIENTE

<p>12. Explica o comportamento do PSA: (1) na hiperplasia benigna, o crescimento do PSA é proporcional ao tamanho da próstata; (2) no câncer, o aumento é progressivo e lento; (3) na prostatite, o aumento é rápido e abaixa após o tratamento. Adequado: explica as três condições. Parcialmente adequado: explica uma ou duas das condições acima. Inadequado: não explica nenhuma das três condições.</p>	0	0,6	1,2
<p>13. Orienta o monitoramento do PSA após o tratamento inicial. Adequado: orienta. Inadequado: não orienta.</p>	0		0,6
<p>14. Realiza a sequência das tarefas indicadas nas orientações ao(à) participante. Adequado: realiza. Inadequado: não realiza.</p>	0		0,5

ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Pediatria

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
DADOS ANAMNÉSICOS			
<p>1. Apresentação: (1) identifica-se; (2) cumprimenta mãe de maneira adequada/cordial; (3) mantém contato visual; (4) pergunta o nome da mãe e da criança. Adequado: realiza os quatro itens.</p> <p>Parcialmente adequado: realiza dois ou três itens.</p> <p>Inadequado: realiza um ou nenhum item.</p>	0	0,25	0,5
<p>2. Realiza anamnese: (1) pergunta sinais e sintomas associados à queixa principal; (2) pergunta sobre os dados antenatais (gestação) ou dados perinatais (dados do RN) ou solicita a caderneta de saúde da criança/caderneta de vacinas/<u>caderneta de imunização</u>;</p> <p>(3) pergunta sobre antecedentes familiares; (4) pergunta sobre a situação epidemiológica.</p> <p>Adequado: realiza quatro itens.</p> <p>Parcialmente adequado: realiza dois a três itens, sendo o item (1) obrigatório.</p> <p>Inadequado: realiza apenas um ou nenhum item.</p>	0	1,5	3,0
DADOS DO EXAME FÍSICO E DADOS DA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA			
<p>3. Interpreta o exame físico: febre sem outras alterações.</p> <p>Adequado: interpreta.</p> <p>Inadequado: não interpreta ou interpreta com outros achados.</p>	0		0,5

<p>4. Solicita exames complementares: (1) hemograma; (2) proteína C-Reativa ou procalcitonina; (3) hemocultura; (4) exame de urina (rotina de urina, urinatipo 1, parcial de urina, sumário de urina, EAS ou similares); (5) urocultura; (6) radiografia de tórax (Raio X de tórax); (7) coleta de líquido cefalorraquidiano (líquor/LCR); (8) pesquisa de vírus respiratórios em nasofaringe (Sars-Cov-2; influenza;VSR).</p> <p>Adequado: solicita sete a oito itens.</p> <p>Parcialmente adequado: solicita quatro a seis itens.</p> <p>Inadequado: solicita três itens ou menos.</p>	0	1,25	2,5
EXPLICAÇÃO DA PROPOSTA TERAPÊUTICA À MÃE / CONDUTA			
<p>5. Formula a hipótese diagnóstica de febre sem sinais localizatórios.</p> <p>Adequado: formula.</p> <p>Inadequado: não formula ou formula outras hipóteses, como: febre, febre a ser esclarecida, febre de origem obscura, febre de origem indeterminada, sepse, sepse neonatal tardia, bacteremia oculta, infecção do trato urinário oculta, pneumonia oculta.</p>	0		1,0
<p>6. Indica necessidade de internação do recém-nascido.</p> <p>Adequado: indica.</p> <p>Inadequado: não indica.</p>	0		1,0
<p>7. Indica a proposta terapêutica (antibioticoterapia empírica, parenteral, endovenosa ou intramuscular, ampicilina + cefotaxima ou ampicilina + ceftriaxona).</p> <p>Adequado: indica.</p> <p>Inadequado: não indica ou indica antibioticoterapia via oral ou indica outro esquema de antibióticos.</p>	0		1,0
<p>8. Realiza adequadamente tarefas, conforme solicitado nas orientações ao (à) participante.</p> <p>Adequado: realiza todas as tarefas propostas na ordem solicitada, podendo comunicar a decisão da internação a qualquer momento da consulta.</p> <p>Inadequado: não realiza as tarefas propostas na ordem solicitada, independentemente do momento de comunicar a decisão da internação.</p>	0		0,5

ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Ginecologia e Obstetrícia

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
ATENDIMENTO INICIAL E HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS			
<p>1. Apresentação: (1) pede à paciente que se sente. (2) tenta acalmar a paciente (com palavras ou gestos, como oferta de lenço de papel/copo de água). Adequado: realiza os dois procedimentos. Parcialmente adequado: realiza apenas um dos procedimentos. Inadequado: não realiza nenhum dos procedimentos.</p>	0	0,25	0,5
<p>2. Pergunta se a paciente tem parcerias sexuais ou parceria fixa. Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta.</p>	0		0,5
<p>3. Pergunta qual foi a data da última menstruação da paciente. Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta.</p>	0		0,5
<p>4. Pergunta sobre a utilização de método anticoncepcional. Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta.</p>	0		0,5
<p>5. Pergunta se a gravidez foi planejada e/ou desejada. Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta.</p>	0		0,5

<p>6. Pergunta quando foi realizado o último exame preventivo (citologia OU colpocitologia OU papanicolau). Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta.</p>	0		0,5
PROPEDÊUTICA			
<p>7. Indica a realização de teste sanguíneo de gravidez/ beta hCG. Adequado: indica. Inadequado: não indica.</p>	0		1,5
<p>8. Informa à paciente que: (1) a imagem no ultrassom só pode ser vista após determinado valor de beta hCG; (2) os batimentos cardíacos fetais só podem ser auscultados no ultrassom após cinco ou seis semanas de gestação. Adequado: fornece as duas informações. Parcialmente adequado: fornece apenas uma informação. Inadequado: não fornece nenhuma das duas informações indicadas.</p>	0	0,75	1,5
<p>9. Menciona: (1) oferta de apoio psicológico e assistência social; (2) possibilidade de doação legal do bebê; (3) necessidade de apoio social específico (parceria e/ou familiares e/ou amigos). Adequado: cita pelo menos um item. Inadequado: não cita item algum.</p>	0		0,5
<p>10. Informa que o arcabouço normativo brasileiro não permite, nas circunstâncias da paciente, a realização de aborto. Adequado: informa. Inadequado: não informa.</p>	0		1,5
<p>11. Cita as situações em que o aborto é permitido no Brasil: (1) estupro; (2) risco materno; (3) feto anencéfalo. Adequado: cita integralmente as três situações. Parcialmente adequado: cita apenas duas situações. Inadequado: cita uma situação ou não cita situação alguma.</p>	0	0,75	1,5
ORIENTAÇÕES FINAIS			
<p>12. Tranquiliza a paciente, explicando que ela terá a assistência necessária ao acompanhamento de sua gravidez. Adequado: explica. Inadequado: não explica.</p>	0		0,5

ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO			
<p>1. Apresentação: (1) cumprimenta o paciente simulado; (2) identifica-se; (3) dirige-se ao paciente simulado pelo nome, pelo menos uma vez; (4) pergunta o motivo da consulta; (5) ouve o paciente com atenção.</p> <p>Adequado: realiza as cinco ações.</p> <p>Parcialmente adequado: realiza de duas a quatro ações.</p> <p>Inadequado: realiza uma ação ou não realiza ação alguma.</p>	0,0	0,25	0,5
<p>2. Postura: (1) estabelece contato visual e (2) mantém postura empática ao longo da consulta.</p> <p>Adequado: realiza as duas ações.</p> <p>Parcialmente adequado: realiza apenas uma das ações.</p> <p>Inadequado: não realiza ação alguma.</p>	0,0	0,15	0,25
<p>3. Escuta a fala do paciente simulado sem interrompê-lo.</p> <p>Adequado: realiza integralmente a ação.</p> <p>Inadequado: não realiza a ação ou não realiza a ação integralmente.</p>	0,0		0,25
<p>4. Usa linguagem acessível ao paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão.</p> <p>Adequado: utiliza linguagem acessível.</p> <p>Inadequado: não utiliza linguagem acessível.</p>	0,0		0,25
<p>5. Responde às perguntas do paciente simulado.</p> <p>Adequado: responde às perguntas.</p> <p>Inadequado: não responde às perguntas.</p>	0,0		0,25
DIAGNÓSTICO CLÍNICO-LABORATORIAL			

<p>6. Explora as características da dor: (1) tempo de início e duração; (2) localização e irradiação; (3) qualidade/tipo; (4) intensidade e evolução; (5) fatores desencadeantes e atenuantes, e (6) manifestações concomitantes.</p> <p>Adequado: pergunta sobre as dez características da dor.</p> <p>Parcialmente adequado: pergunta quatro a seis características da dor.</p> <p>Inadequado: pergunta sobre uma a três características da dor ou não pergunta sobre característica alguma.</p>	0,0	1,0	1,5
<p>7. Investiga sintomas associados: (1) respiratórios; (2) geniturinários; (3) gastrintestinais (4) sistêmicos (febre, mal-estar).</p> <p>Adequado: investiga os quatro grupos de sintomas associados.</p> <p>Parcialmente adequado: investiga dois a três grupos de sintomas associados.</p> <p>Inadequado: investiga um grupo de sintomas associados ou não investiga grupo de sintomas associados algum.</p>	0,0	0,50	1,0
<p>8. Pergunta sobre a existência de lesões em mucosas (boca, genitália ou ânus).</p> <p>Adequado: pergunta se há lesões em mucosas.</p> <p>Inadequado: não pergunta sobre lesões em mucosas.</p>	0,0		0,5
<p>9. Descreve as características da lesão: (1) placa eritematosa; (2) associação com lesões vesiculares; (3) obedece ao trajeto de um dermatomo.</p> <p>Adequado: descreve as três características da lesão.</p> <p>Parcialmente adequado: descreve duas características da lesão.</p> <p>Inadequado: descreve uma característica da lesão ou não descreve característica alguma.</p>	0,0	0,75	1,5
<p>10. Realiza diagnóstico de Herpes Zoster.</p> <p>Adequado: realiza o diagnóstico.</p> <p>Inadequado: não realiza o diagnóstico.</p>	0,0		2,0
<p>11. Cita os principais diagnósticos diferenciais para o caso: (1) pielonefrite; (2) nova varíola ou monkeypox; (3) varicela; (4) lombalgia mecânica/DORT; (5) urolitíase.</p> <p>Adequado: cita os cinco principais diagnósticos diferenciais.</p> <p>Parcialmente adequado: cita dois a quatro principais diagnósticos diferenciais.</p> <p>Inadequado: cita um dos principais diagnósticos diferenciais ou não cita diagnóstico diferencial algum.</p>	0,0	0,50	1,0
PLANO TERAPÊUTICO, DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE TRABALHO EM EQUIPE			
<p>12. Indica tratamento: (1) medicações sintomáticas (analgésico/antitérmico e/ou anti-inflamatório); (2) antiviral oral (Aciclovir, Fanciclovir, Valaciclovir).</p> <p>Adequado: indica ambos os tratamentos.</p> <p>Parcialmente adequado: indica um dos tratamentos.</p> <p>Inadequado: não indica tratamento algum.</p> <p>Atenção: A indicação de anti-histamínicos e/ou</p>	0,0	0,40	1,0

posologia do antiviral não afeta a pontuação nesta questão.

Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos Expedidos por Instituição de Educação
Superior Estrangeira

2022/2

ESTAÇÃO 6 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Clínica Médica

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
ANAMNESE			
1. Apresentação: (1) identifica-se e (2) cumprimenta a paciente simulada. Adequado: realiza as duas ações. Inadequado: realiza uma ação ou não realiza ação alguma.	0		0,25
2. Pergunta sobre sinais e sintomas relacionados à anemia: (1)TGI (perda sanguínea como melena (ou sangue nas fezes), hematêmese); (2) ginecológica (alterações menstruais); (3) nutricional (alteração de apetite ou perguntar se estar se alimentando bem); (4) neoplásica (perda de peso não intencional recente). Adequado: pergunta quatro itens. Parcialmente adequado: pergunta dois ou três itens. Inadequado: pergunta um item ou não pergunta item algum.	0	0,75	1,5
3. Pergunta sobre manifestações neurológicas: (1) alterações marcha; (2) perda de força (ou fraqueza); (3) alterações de equilíbrio (quedas ou tontura). Adequado: pergunta qualquer um dos itens. Inadequado: não pergunta. Observação: não pontuará o(a) participante que mencionar o(s) sintoma(s) após a leitura do IMPRESSO 2.	0		0,5

<p>4. Solicita: (1) exame físico geral; (2) exame neurológico. Adequado: solicita ambos. Parcialmente adequado: solicita apenas um exame. Inadequado: não solicita exame algum.</p>	0	0,5	1,0
<p>5. Solicita: (1) hemograma; (2) vitamina B12 (cianocobalamina); (3) qualquer exame da cinética do ferro (ferro sérico, ferritina sérica, índice de saturação de transferrina); Adequado: solicita todos os três exames. Parcialmente adequado: solicita pelo menos hemograma e nível sérico de vitamina B12. Inadequado: solicita um ou nenhum dos exames listados. Atenção: o (a) participante só irá pontuar caso ele(a) cite os exames listados ANTES de receber o impresso</p>	0	0,75	1,5
<p>6. Identification achados laboratoriais: (1) hemograma com VCM aumentado; (2) vitamina B12 baixa; (3) ferro sérico normal. Adequado: identifica as três alterações. Parcialmente adequado: identifica duas alterações. Inadequado: identifica uma alteração ou não identifica alteração alguma.</p>	0	0,25	0,5
<p>7. Estabelece o diagnóstico de anemia megaloblástica secundária à deficiência de vitamina B12 (ou anemia por deficiência de vitamina B12 ou anemia perniciosa) decorrente da gastroplastia (bypass gástrico ou cirurgia bariátrica). Adequado: estabelece o diagnóstico da anemia megaloblástica (ou anemia por deficiência de vitamina B12 ou anemia perniciosa). Parcialmente adequado: estabelece somente o diagnóstico de anemia, sem especificá-la. Inadequado: não estabelece o diagnóstico de anemia.</p>	0	1,0	2,0
<p>8. Indica tratamento da anemia megaloblástica parenteral ou sublingual de manutenção com vitamina B12. Adequado: indica vitamina B12 e o tempo de tratamento. Parcialmente adequado: indica vitamina B12, mas não refere o tempo de tratamento. Inadequado: não indica o tempo ou indica o tempo incorretamente.</p>	0	0,75	1,5
<p>9. Indica a necessidade de monitoramento dos níveis séricos de vitamina B12. Adequado: indica monitoramento. Inadequado: não indica monitoramento.</p>	0		1,0
<p>10. Realiza adequadamente a sequência das tarefas, conforme solicitado nas orientações ao (à) participante. Adequado: realiza. Inadequado: não realiza.</p>	0		0,25

ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Inadequado
<p>1. Apresentação: (1) identifica-se e (2) cumprimenta apaciente simulada. Adequado: realiza as duas ações. Inadequado: realiza uma ou não realiza ação alguma.</p>	0		0,2
<p>2. Pergunta sobre as características da dor: (1) localização; (2) irradiação; (3) tipo; (4) fatores agravantes/melhora; (5) intensidade. Adequado: pergunta quatro ou cinco itens. Parcialmente adequado: pergunta dois ou três itens. Inadequado: pergunta apenas um item ou não pergunta item algum.</p>	0	0,3	0,6
<p>3. Pergunta sobre sintomas associados: (1) vômito/náusea; (2) alteração de hábito intestinal; (3) acolia; (4) febre; (5) icterícia; e (6) colúria. Adequado: pergunta cinco ou seis itens. Parcialmente adequado: pergunta três ou quatro itens. Inadequado: pergunta dois itens ou menos.</p>	0	0,4	0,8
<p>4. Solicita o exame físico. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p>	0		0,4

<p>5. Solicita os exames complementares laboratoriais: (1) hemograma; (2) PCR; (3) bilirrubinas; (4) enzimas hepáticas; (5) amilase; (6) lipase; (7) fosfatase alcalina; e (8) gamaGT. Adequado: solicita sete ou oito itens. Parcialmente adequado: solicita de quatro a seis itens. Inadequado: solicita três ou menos itens.</p> <p>Atenção: O(A) participante só irá pontuar caso cite os exames listados ANTES de receber os IMPRESSOS 2 e/ou 3.</p>	0	0,7	1,4
<p>6. Verbaliza as alterações dos exames laboratoriais: (1) HMG com leucocitose e (2) PCR aumentado. Adequado: verbaliza os dois itens. Inadequado: verbaliza um item ou não verbaliza item algum.</p>	0		0,5
<p>7. Solicita ultrassom de abdome. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p>	0		0,6
<p>8. Cita a hipótese diagnóstica de colecistite aguda litiásica/calculosa. Adequado: cita o diagnóstico completo. Parcialmente adequado: cita apenas o diagnóstico de colecistite aguda. Inadequado: não cita.</p>	0	0,9	1,8
<p>9. Cita os principais diagnósticos diferenciais: (1) pancreatite aguda; (2) cólica biliar/colecolitíase; (3) cólica nefrética/litíase ou cálculo renal (4) Colecolitíase/colangite. Adequado: cita três ou quatro itens. Parcialmente adequado: cita dois itens. Inadequado: não cita item algum ou somente um .</p>	0	0,65	1,3
<p>10. Indica a antibioticoterapia e encaminha a paciente para a realização de colecistectomia em até 72 horas, idealmente. Adequado: indica o tratamento. Inadequado: não indica o tratamento. Atenção: deverá ser verbalizado que o procedimento deverá ser realizado idealmente em até 72h.</p>	0		1,6
<p>11. Cita as opções cirúrgicas: (1) videolaparoscopia; (2) cirurgia aberta. Adequado: cita os dois itens. Parcialmente adequado: cita um item. Inadequado: não cita item algum.</p>	0	0,15	0,3
<p>12. Realiza a sequência das tarefas indicadas nas orientações ao(à) participante. Adequado: realiza. Inadequado: não realiza.</p>	0		0,5

ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Pediatria

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. Apresentação: (1) identifica-se; (2) cumprimenta a mãe de maneira adequada/cordial; (3) mantém contato visual; (4) pergunta o nome da mãe e da criança.</p> <p>Adequado: realiza os quatro itens. Parcialmente adequado: realiza dois ou três itens. Inadequado: realiza um item ou não realiza item algum.</p>	0	0,25	0,5
<p>2. Realiza anamnese. Pergunta sobre: (1) alteração do volume da bolsa escrotal; (2) se o aumento é intermitente (aumenta e diminui); (3) se notou aumento de volume também de região inguinal; e (4) se o bebê tem dor ou choro durante a manipulação da região inguinoescrotal; e (5) se existem fatores de melhora e piora para alteração do volume da bolsa escrotal.</p> <p>Adequado: pergunta os cinco itens. Parcialmente adequado: pergunta três ou quatro itens. Inadequado: pergunta um, dois ou não pergunta item algum.</p>	0	1,0	2,0
<p>3. Interpreta o achado do exame físico: aumento de volume cístico da bolsa escrotal, sem alterações na região inguinal.</p> <p>Adequado: interpreta. Inadequado: não interpreta.</p>	0		1,5

<p>4. Indica e interpreta a transiluminação da bolsa escrotal positiva com presença de líquido na bolsa escrotal. Adequado: indica e interpreta. Inadequado: não indica e/ou interpreta de forma errada.</p>	0		1,5
<p>5. Realiza o diagnóstico de hidrocele comunicante. Adequado: realiza o diagnóstico de hidrocele comunicante. Parcialmente adequado: realiza o diagnóstico de hidrocele, sem especificar o tipo (comunicante ou septada). Inadequado: não realiza o diagnóstico de hidrocele, ou diagnostica incorretamente como hidrocele septada.</p>	0	0,5	1,0
<p>6. Exames complementares. Adequado: não solicita exames complementares para definir diagnóstico de hidrocele. Inadequado: solicita qualquer tipo de exame laboratorial ou de imagem para definir o diagnóstico de hidrocele.</p>	0		1,0
<p>7. Explica para a mãe a fisiopatologia do conduto peritônio vaginal permeável. Adequado: explica corretamente o mecanismo de persistência de passagem de líquido para a bolsa. Inadequado: não explica corretamente a fisiopatologia da persistência ou simplesmente diz que a bolsa está cheia de líquido.</p>	0		1,0
<p>8. Proposta terapêutica. Adequado: encaminha o bebê ao cirurgião ou urologista pediátrico para definir a melhor conduta e momento cirúrgico. Inadequado: não encaminha o bebê ao cirurgião e/ou indica cirurgia de urgência.</p>	0		1,0
<p>9. Realiza adequadamente a sequência das tarefas, conforme solicitado nas orientações ao (à) participante. Adequado: realiza. Inadequado: não realiza.</p>	0		0,5

ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Ginecologia e Obstetrícia

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
ATENDIMENTO INICIAL E HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS			
1. Apresentação: (1) identifica-se e (2) cumprimenta a paciente simulada. Adequado: realiza as duas ações. Inadequado: realiza uma ação ou não realização alguma.	0		0,5

<p>2. Pergunta sobre as características da úlcera: (1) dor; (2) quantidade de lesões; (3) tempo da lesão; (4) prurido ou ardência; (5) secreção; (6) presença de linfonodos associados. Adequado: pergunta sobre três ou mais itens. Parcialmente adequado: pergunta sobre dois itens. Inadequado: não pergunta ou pergunta apenas sobre um item.</p> <p>Atenção: O(A) participante só pontuará se as perguntas forem feitas durante a anamnese inicial. O(A) participante não pontuará caso já tenha recebido os impressos relativos ao exame físico/ginecológico.</p>	0	0,5	1,0
<p>3. Questiona sobre consultas ginecológicas anteriores. (realização de “preventivo”, “papanicolau”, colpocitologia oncótica ou USTV anterior).</p> <p>Adequado: questiona. Inadequado: não questiona.</p>	0		0,5
EXAME FÍSICO			
<p>4. Solicita exame físico/ginecológico. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p>	0		0,5
EXAME LABORATORIAL/DIAGNÓSTICO			
<p>5. Solicita exame para sífilis (treponêmico ou não treponêmico). Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p>	0		1,5
<p>6. Solicita outros exames para infecções sexualmente transmissíveis: (1) HIV; (2) clamídia; (3) hepatite B; (4) hepatite C; (5) herpes; (6) gonorreia; (7) HTLV. Adequado: solicita pelo menos quatro itens. Parcialmente adequado: solicita três itens. Inadequado: solicita dois ou menos itens.</p>	0	0,5	1,0
<p>7. Cita os principais diagnósticos diferenciais, como: (1) donovanose; (2) cancro mole; (3) herpes genital; (4) linfogranuloma venéreo; (5) doença de Behçet; (6) úlcera pós-infecciosa (Lipschutz). Adequado: cita dois ou mais itens. Parcialmente adequado: cita um item. Inadequado: não cita item algum.</p>	0	0,5	1,0

<p>8. Estabelece o diagnóstico de sífilis recente/sífilis primária. Adequado: estabelece o diagnóstico de sífilis recente/sífilis primária. Parcialmente adequado: estabelece apenas o diagnóstico de sífilis, sem especificar sífilis recente/sífilis primária. Inadequado: não estabelece o diagnóstico ou cita fase incorreta da sífilis (tardia/latente/secundária/terciária).</p>	0	0,75	1,5
PRESCRIÇÃO			
<p>9. Prescreve penicilina benzatina: 2,4 milhõesUI em dose única via intramuscular (1,2 milhões UI em cada glúteo). Adequado: prescreve o medicamento com dose e via de administração corretas. Parcialmente adequado: prescreve o medicamento adequado, mas sem mencionar a dose adequada ou com a dose e/ou via de administração incorretas. Inadequado: não prescreve o medicamento adequado.</p>	0	0,75	1,5
<p>10. Informa a necessidade de tratamento das parcerias sexuais. Adequado: informa. Inadequado: não informa.</p>	0		0,5
ORIENTAÇÃO FINAL			
<p>11. Notifica o caso de sífilis. Adequado: notifica. Inadequado: não notifica.</p>	0		0,5

Revalida

Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

2022/2

ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - DEFINITIVO

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO			

<p>1. Apresentação: (1) cumprimenta a paciente simulada; (2) identifica-se; (3) dirige-se à paciente simulada pelo nome, pelo menos uma vez; (4) faz perguntas; (5) e ouve com atenção o motivo da consulta. Adequado: realiza as cinco ações. Parcialmente adequado: realiza duas a quatro ações. Inadequado: realiza uma ação ou não realiza ação alguma.</p>	0,0	0,25	0,50
<p>2. Postura: (1) estabelece contato visual e (2) mantém postura empática ao longo da consulta. Adequado: realiza as duas ações. Parcialmente adequado: realiza apenas uma das ações. Inadequado: não realiza nenhuma das ações.</p>	0,0	0,15	0,25
<p>3. Escuta a fala da paciente simulada sem interrompê-la. Adequado: realiza integralmente a ação. Inadequado: não realiza a ação.</p>	0,0		0,25
<p>4. Usa linguagem acessível com a paciente simulada, evitando termos técnicos de difícil compreensão. Adequado: usa linguagem acessível. Inadequado: não usa linguagem acessível.</p>	0,0		0,25
<p>5. Evita atitude paternalista (condescendente) e “alarmista.” Adequado: evita as duas atitudes. Inadequado: assume qualquer uma das duas atitudes.</p>	0,0		0,25
ABORDAGEM INTEGRAL AO ADOLESCENTE			
<p>6. Investiga os antecedentes pessoais do adolescente: (1) doenças prévias; (2) internações; (3) cirurgias anteriores; (4) alergias; (5) uso de medicações. Adequado: investiga os cinco itens. Parcialmente adequado: investiga dois a quatro itens. Inadequado: investiga um item ou não investiga item algum.</p>	0,0	0,50	1,0
<p>7. Investiga o contexto familiar do adolescente: relações entre os pais e/ou existência de violência doméstica. Adequado: investiga o contexto familiar. Inadequado: não investiga o contexto familiar.</p>	0,0		0,75
<p>8. Investiga aspectos da maturidade sexual: pelos pubianos e/ou tamanho dos testículos. Adequado: investiga pelo menos um dos aspectos citados. Inadequado: não investiga os aspectos citados.</p>	0,0		0,75
<p>9. Investiga: (1) tabagismo; (2) uso de álcool; (3) uso de outras drogas; (4) aspectos da saúde mental; (5) alimentação; (6) atividade física. Adequado: investiga pelo menos quatro itens. Parcialmente adequado: investiga dois ou três itens. Inadequado: investiga um ou nenhum item.</p>	0,0	0,75	1,25
ABORDAGEM DA IMUNIZAÇÃO			

<p>10. Investiga o histórico de vacinação para COVID-19. Adequado: investiga o histórico. Inadequado: não investiga o histórico.</p>	0,0		1,0
<p>11. Recomenda vacinação para HPV. Adequado: recomenda aplicação da vacina para HPV e indica a idade correta de aplicação (dos 09 aos 14 anos). Parcialmente adequado: recomenda aplicação da vacina para HPV e não indica a idade da aplicação ou informa a idade incorreta. Inadequado: não recomenda aplicação da vacina para HPV.</p>	0,0	0,50	1,0
<p>12. Recomenda dose de reforço da vacina para HPV. Adequado: recomenda a dose de reforço 6 (seis) meses após a primeira dose. Parcialmente adequado: recomenda a dose de reforço, mas não indica o intervalo correto entre as doses ou indica o intervalo incorreto. Inadequado: não recomenda a dose de reforço da vacina para HPV.</p>	0,0	0,25	0,75
<p>13. Recomenda atualização do cartão de vacina: (1) Meningococos ACWY: dose única para adolescentes não vacinados de 11 a 14 anos de idade; (2) dT (Difteria e Tétano): dose de reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos, em caso de ferimento grave. Adequado: recomenda as duas vacinas com respectivos aprazamentos. Parcialmente adequado: recomenda as duas vacinas sem indicar o aprazamento OU recomenda uma vacina com aprazamento. Inadequado: não recomenda nenhuma das duas vacinas ou recomenda só uma vacina sem indicar aprazamento.</p>	0	0,5	1,0
<p>14. Recomenda atualização do cartão de vacina: (1) Influenza/gripe: dose anual; (2) Febre Amarela: dose de reforço. Adequado: recomenda as duas vacinas com respectivos aprazamentos. Parcialmente adequado: recomenda as duas vacinas sem indicar o aprazamento OU recomenda uma vacina com aprazamento. Inadequado: não recomenda nenhuma das duas vacinas ou recomenda só uma vacina sem indicar aprazamento.</p>	0	0,5	1,0

